

果樹カメムシ類の越冬密度調査結果

2025.5.7時点

- ・都道府県が実施した果樹カメムシ類の越冬密度調査結果をとりまとめたものです。
- ・下記の点にご注意ください。
  - ①調査手法・時期は県毎に異なるため、県間が比較できるデータではないことにご注意ください。
  - ②果樹カメムシ類の発生量は地域間差がありますので、調査結果に関わらず、ご自身の園地の発生には引き続きご注意ください。

県名	対象種	平年比	調査結果	平年値	昨年値(参考)
岩手県	クサギ	並	150.3頭 (3地点平均)	114.9頭 (3地点平均)	47.3頭 (3地点平均)
秋田県	クサギ	並	6.8頭/地点	7.5頭/地点	3.3頭/地点
山形県	クサギ	越冬前虫数：多 越冬後生存虫数：多	越冬前虫数：95 越冬後生存虫数：73	越冬前虫数：30.6 越冬後生存虫数：26.2	越冬前虫数：19 越冬後生存虫数：18
福島県	クサギ	並	12.8頭/ムシロ1枚	13.6頭/ムシロ1枚	10.2頭/ムシロ1枚
茨城県	チャバネ	少	越冬成虫数0.05頭/落葉30ℓ 越冬地点率5%	越冬成虫数2.3頭/落葉30ℓ 越冬地点率41%	越冬成虫数9.7頭/落葉30ℓ 越冬地点率86%
栃木県	チャバネ	—	0.03頭/m <sup>2</sup> (13地点中1地点で1頭のみ確認)	—	—
群馬県	チャバネ	少	0.2頭/m <sup>2</sup>	0.8頭/m <sup>2</sup>	2.5頭/m <sup>2</sup>
埼玉県	チャバネ	並	0.75頭/3m <sup>2</sup>	1.09頭/3m <sup>2</sup>	4.75頭/3m <sup>2</sup>
東京都	チャバネ	—	0頭/m <sup>2</sup>	—	—
神奈川県	チャバネ・ツヤアオ	並	4.4頭/落ち葉200L	4.8頭/落ち葉200L	9.1頭/落ち葉200L
神奈川県	ツヤアオ	少	0.8頭/100枝	3.9頭/100枝	12.0頭/100枝
山梨県	チャバネ	—	1頭/100L	—	—
長野県	チャバネ	—	0頭/m <sup>2</sup>	—	—
静岡県	チャバネ・ツヤアオ	多	2.9頭/m <sup>2</sup>	1.0頭/m <sup>2</sup>	0.5頭/m <sup>2</sup>
岐阜県	チャバネ	多	1.7頭/50L(平均)	0.9頭/50L(平均)	3.0頭/50L(平均)
愛知県	チャバネ	並	0.69頭/m <sup>2</sup>	0.58頭/m <sup>2</sup>	0.86頭/m <sup>2</sup>
三重県	チャバネ・クサギ	やや少～少	・チャバネアオカメムシ 0.6頭/地点(3m <sup>2</sup> ) ・クサギカメムシ 0頭/地点(参考値)	・チャバネアオカメムシ 3.3頭/地点(3m <sup>2</sup> ) ・クサギカメムシ 34.4頭/地点	・チャバネアオカメムシ 12.2頭/地点(3m <sup>2</sup> ) ・クサギカメムシ 29.8頭/地点
滋賀県	チャバネ	並	0.88頭/50L	1.14頭/50L	3.0頭/50L
京都府	チャバネ	並	0.2頭/m <sup>2</sup>	0.5頭/m <sup>2</sup>	0.6頭/m <sup>2</sup>
大阪府	チャバネ	—	0頭/m <sup>2</sup>	—	—
奈良県	チャバネ	少	0.6頭/地点	8.1頭/地点 (直近10年の平均値)	29.2頭/地点
和歌山県	チャバネ	やや少	0.2頭/50L	0.6頭/50L	2.9頭/50L
鳥取県	クサギ	やや少	平均4.4頭/トラップ当たり	平均9.9頭/トラップ当たり (H28年～R5年の平均)	平均26.3頭/トラップ当たり
広島県	チャバネ・クサギ	やや少	・チャバネアオカメムシ 0.17頭/地点 ・クサギカメムシ 20.8頭/地点	・チャバネアオカメムシ 0.3頭/地点 ・クサギカメムシ 7.8頭/地点	・チャバネアオカメムシ 0.76頭/地点 ・クサギカメムシ 3.5頭/地点

県名	対象種	平年比	調査結果	平年値	昨年値（参考）
山口県	クサギ	少	3.1頭/トラップ	30.9頭/トラップ	96.4頭/トラップ
徳島県	チャバネ	少	0.2頭/m <sup>2</sup>	3.5頭/m <sup>2</sup>	15.7頭/m <sup>2</sup>
香川県	チャバネ	—	0頭/m <sup>2</sup>	—	—
愛媛県	チャバネ	少	0頭/m <sup>2</sup>	1.09頭/m <sup>2</sup>	3.88頭/m <sup>2</sup>
福岡県	チャバネ	少	0.1頭/m <sup>2</sup>	1.7頭/m <sup>2</sup>	2.3頭/m <sup>2</sup>
佐賀県	チャバネ	やや少	0.14頭/m <sup>2</sup>	0.33頭/m <sup>2</sup>	0.84頭/m <sup>2</sup>
長崎県	チャバネ	やや少	0.08頭/m <sup>2</sup>	0.3頭/m <sup>2</sup>	0.77頭/m <sup>2</sup>
熊本県	チャバネ	少	2頭/3m <sup>2</sup> /16地区	25.0頭/3m <sup>2</sup> /16地区	46頭/3m <sup>2</sup> /16地区
大分県	チャバネ	並	0.11頭/m <sup>2</sup>	0.25頭/m <sup>2</sup>	0.78頭/m <sup>2</sup>

(注釈)

- ・対象種：チャバネ：チャバネアオカメムシ、クサギ：クサギカメムシ、ツヤアオ：ツヤアオカメムシ
- ・平年比：多、やや多、並、やや少、少
- ・「—」：今年度から実施のため、平年比、昨年値、平年値なし