

トマトキバガ登録農薬一覧(令和7年3月時点)

最新の農薬の登録情報につきましては、こちらでご確認をお願いいたします。
<https://pesticide.maff.go.jp/>

○トマト

農薬の種類	使用方法	使用時期	散布液量	希釈倍数使用量	本剤の使用回数
BT水和剤	散布	発生初期 但し、収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	－
BT水和剤	散布	発生初期 但し、収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	－
BT水和剤	散布	発生初期 但し、収穫前日まで	100～300ml/㎡	1000倍	－
アバメクチン	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	500～1000倍	3回以内
インドキサカルブ水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	2回以内
エマメクチン安息香酸乳剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	5回以内
クロラントラニプロール水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	3回以内
クロラントラニプロール水和剤	灌注	育苗期後半～定植当日	1株当り25ml	100倍	1回
クロルフェナビル水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	3回以内
シアントラニプロール水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	3回以内
シアントラニプロール水和剤	灌注	育苗期後半～定植当日	400株当り10～20L(1株当り25～50ml)	400株当り25ml	1回
シアントラニプロール粒剤	株元散布	育苗期後半～定植時	－	2g/株	1回
スピネトラム水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2500～5000倍	2回以内
テトラニプロール水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2500倍	3回以内
ピリダリル水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	2回以内
フルキサメタミド乳剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	2回以内
フルベンジアミド水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	2回以内
メタフルミゾン水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	3回以内
レビメクチン乳剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	3回以内
脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	2回以内

○ミニトマト

農薬の種類	使用方法	使用時期	散布液量	希釈倍数使用量	本剤の使用回数
BT水和剤	散布	発生初期 但し、収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	－
BT水和剤	散布	発生初期 但し、収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	－
BT水和剤	散布	発生初期 但し、収穫前日まで	100～300ml/㎡	1000倍	－
エマメクチン安息香酸乳剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	5回以内
クロラントラニプロール水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	3回以内
クロラントラニプロール水和剤	灌注	育苗期後半～定植当日	1株当り25ml	100倍	1回
クロルフェナビル水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	3回以内
シアントラニプロール水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	3回以内
シアントラニプロール水和剤	灌注	育苗期後半～定植当日	400株当り10～20L(1株当り25～50ml)	400株当り25ml	1回
シアントラニプロール粒剤	株元散布	育苗期後半～定植時	－	2g/株	1回
スピネトラム水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2500～5000倍	2回以内
テトラニプロール水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2500倍	3回以内
ピリダリル水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	2回以内
フルキサメタミド乳剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	2回以内
フルベンジアミド水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	2000倍	2回以内
メタフルミゾン水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	3回以内
レビメクチン乳剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	3回以内
脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤	散布	収穫前日まで	100～300L/10a	1000倍	2回以内