組換え DNA 技術応用飼料添加物の 安全性確認

JPBL011 株を利用して生産された α-アミラーゼ

令和4年12月20日 農林水産省消費·安全局 畜水産安全管理課

目次

Ι	はじめに	2
II	確認対象飼料添加物の概要	2
III	審議内容	2
1	生産物の既存のものとの同等性に関する事項	3
2	組換え体等に関する事項	3
(1)GILSP(Good Industrial Large-Scale Practice)組換え体又はカテゴリー1組換 体を安全に取り扱うことができる作業レベルでの製造に用い得る非病原性の組換え であることに関する事項	.体
(:	2)組換え体の利用目的及び利用方法に関する事項	
-	3)宿主に関する事項	
•	~	
-	・/	
((6) 組換え体に関する事項	
3	組換え体以外の製造原料及び製造器材に関する事項	
(1) 飼料又は飼料添加物の製造原料としての使用実績及び安全性に関する事項	
(:	2)飼料又は飼料添加物の製造器材としての使用実績及び安全性に関する事項	9
4	生産物に関する事項	9
(1)組換え体の混入を否定する事項	9
(:	2)製造に由来する不純物の安全性に関する事項	9
(;	3)精製方法及びその効果に関する事項	9
(4	4)含有量の変動により有害性が示唆される常成分の変動に関する事項	9
(!	5)組換え体によって製造された生産物の外国における認可及び使用等の状況に関す	·る
	事項	10
5	2から4までにより安全性に関する知見が得られていない場合は次の試験のうち必な試験の成績に関する事項	
IV	審議結果	10
V	参考文献及び参考資料	10

「JPBL011 株を利用して生産された α-アミラーゼ」に係る安全性確認

I はじめに

5

25

30

「JPBL011 株を利用して生産された α -アミラーゼ」(以下、「JPBL011 α -アミラーゼ」とする。)について、令和 4 年 7 月 5 日付けで遺伝子組換え飼料添加物としての安全性確認の申請があったことから、「組換え DNA 技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続」(平成 14 年 11 月 26 日農林水産省告示第 1780 号)に基づき審議を行った。

10 II 確認対象飼料添加物の概要

添加物: JPBL011 株を利用して生産された α-アミラーゼ

製品名:Ronozyme HiStarch (ロノザイム ハイスターチ) (液状品・顆粒品)

Ronozyme RumiStar (ロノザイム ルミスター) (液状品・顆粒品)

15 有効成分概要

一般名	化学名(IUPAC)	EC 番号	CAS 番号	機能
α-アミラーゼ	1,4-α-D-Glucan	3. 2 1 1	9000-90-2	グリコシド
alpha-	glucanohydrolase			結合の分解
amylase				

用 途:飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

申請者: ノボザイムズジャパン株式会社

開発者: Novozymes A/S

JPBL011α-アミラーゼは、でんぷんの消化を促進する α-アミラーゼの生産性を高めるため、Bacillus licheniformis Ca63 株(以下、「Ca63 株」とする。)を宿主として、Geobacillus stearothermophilus ATCC7953 株由来の α-アミラーゼ遺伝子に変異を導入して得られた改変 amyS 遺伝子を宿主改変株の染色体へ導入して作成した JPBL011 株により生産された α-アミラーゼである。

また、宿主である Ca63 株、改変 amyS遺伝子の供与体である G. stearothermophilus ATCC7953 株及び生産菌である JPBL011 株の安全性、製造器材・製造工程の安全性並びに不純物を含めた生産物の安全性について確認したところ、飼料添加物としての安全上の問題となる点は認められなかった。

農業資材審議会飼料分科会遺伝子組換え飼料部会における審議の結果、JPBL011a-アミラーゼについて、「組換え DNA 技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続」(平成 14 年 11 月 26 日農林水産省告示第 1780 号)に基づき、遺伝子組換え飼料添加物として摂取する家畜等への安全上の問題はないと判断された。

III 審議内容

35 1 生産物の既存のものとの同等性に関する事項

JPBL011 α -アミラーゼは Ca63 株に導入された G. stearothermophilus ATCC7953 株の遺伝子によって産生される。既存の α -アミラーゼを比較対象として、アミノ酸配列の比較、生化学的性質(有効成分、酵素活性)の比較を実施した。その結果、アミノ酸配列の相同性は %と比較的高く、また、活性部位となるアミノ酸残基も保存されており、活性部位は共通していることから、生化学的性質に多少の違いはあるが、JPBL011 α -アミラーゼが既存の α -アミラーゼと同等と考えるに十分であると確認された。

2 組換え体等に関する事項

40

50

55

70

45 (1) GILSP (Good Industrial Large-Scale Practice) 組換え体又はカテゴリー1組換え体を安全に取り扱うことができる作業レベルでの製造に用い得る非病原性の組換え体であることに関する事項

宿主Ca63株は、分子生物学の研究分野で広く利用されている市販株で、全ゲノム 配列が利用可能である。また、国立感染症研究所の病原体等安全管理規定におけるバ イオセーフティーレベル2あるいは3に相当する病原体等のリストには含まれていな い。

ベクター及び挿入遺伝子については、分子量及び制限酵素による切断地図等が明らかにされており、既知の有害な塩基配列は含まれておらず、組換え体の外界での安定性が増大するようなものではない。

組換え体のJPBL011株は、非病原性であり、工業的利用の場において宿主Ca63株と同程度に安全であると考えられる。

以上のことから、JPBL011株はGILSP組換え体に該当すると考えられた。

(2) 組換え体の利用目的及び利用方法に関する事項

50 JPBL011株は、飼料添加物α-アミラーゼの生産効率を向上させる目的で利用され、 既存の添加物の生産菌と同様の方法で利用される。なお、JPBL011α-アミラーゼは、 豚、家禽(鶏)及び牛用配合飼料に添加することにより、消化管でのでんぷんの消化 が促進され、エネルギーの利用効率が上昇する。

65 (3) 宿主に関する事項

ア 学名、株名等の分類学上の位置付けに関する事項 学名: Bacillus licheniformis Ca63株 (本文中、「Ca63株」と記載)

イ 病原性及び有害生理活性物質の生産に関する事項

B. licheniformisは食品用酵素の生産菌として広く使用されている胞子形成菌であり、その安全性が知られている。

また国立感染症研究所の病原体等安全管理規程(国立感染症研究所, 2010a)においては、B. licheniformis はバイオセーフティーレベル(BSL)2及びBSL3の実験

室や施設を要する病原体等に分類されていない。またヒトあるいは動物に疾病を起こす見込みがなく(Barbesgaard *et al.*, 1992)、病原体等のリスク群分類のリスク群1に分類される(国立感染症研究所, 2010b)。

ウ 寄生性及び定着性に関する事項

75

80

95

100

105

- B. licheniformis が、哺乳動物に対して寄生性又は定着性を持つとの報告はない。
- エ ウイルス等の病原性の外来因子に汚染されていないことに関する事項 Ca63株は、社内の安全管理規定に基づく実験室及び製造設備内で取り扱われているため、病原性の外来因子に汚染されることはない。
- 85 オ 自然環境を反映する実験条件の下での生存及び増殖能力に関する事項 B. licheniformis は自然界に広く分布する芽胞形成菌であり、自然環境下において 生存及び増殖する能力を有する。宿主であるCa63株についても同様である。
 - カ 有性又は無性生殖周期及び交雑性に関する事項
- 90 *B. licheniformis*に有性生殖周期は見つかっておらず、無性生殖周期のみが知られている。一般的に、分類学上近縁種同士の微生物の交雑は起こり得るとされている。
 - キ 飼料に利用された歴史に関する事項
 - B. licheniformis は、家禽及び家畜の飼料用アルカリ性プロテアーゼの生産菌として、長年利用されていることから、家畜が摂取しても健康に影響を及ぼすおそれはないと考えられた。
 - ク 生存及び増殖能力を制限する条件に関する事項
 - B. licheniformis は自然界に広く分布する胞子形成菌である。至適増殖温度は 30~50℃であり、増殖可能最高温度は 55 ℃である。また、90 ℃付近で死滅する。
 - ケ 類縁株の病原性及び有害生理活性物質の生産に関する事項

Bacillus 属の中で*B. licheniformis* と比較的近い近縁種は、*B. subtilis*及び*B. pumilus* であるが、EPAのDecision Document によると、これらは*B. licheniformis* と同様、非病原性かつ非毒素産生性とみなされており、毒性物質を産生することが知られている*B. cereus* 等とは明確に区別されるとしている(Bacillus licheniformis TSCA)。

- (4) ベクターに関する事項
- 110 ア 名称及び由来に関する事項

挿入遺伝子の宿主への導入に用いられた遺伝子導入用ベクターpJPV043、pJPV044、pJPV045及びpJPV035は*Staphylococcus aureus*由来のプラスミドである pE194 を基に作製されている。

115 イ 性質に関する事項

120

125

130

135

(ア) DNAの分子量を示す事項

pJPV043の塩基数は bp、pJPV044の塩基数は bp、pJPV045の塩基数は bp、pJPV035の塩基数は bpである。

(イ)制限酵素による切断地図に関する事項

pJPV043、pJPV044、pJPV045及びpJPV035の制限酵素による切断地図は明らかになっている。

- (ウ) 既知の有害塩基配列を含まないことに関する事項
- pJPV043、pJPV044、pJPV045及びpJPV035の機能及び性質は明らかであり、 既知の有害なたん白質を産生する塩基配列は含まれていない。
- ウ 薬剤耐性に関する事項

プラスミドpE194は、エリスロマイシン耐性を付与するermC遺伝子を有する。ermC遺伝子はS. aureus 由来であり、この遺伝子がコードするアデニンメチラーゼによってエリスロマイシン耐性が付与される。

なおermC遺伝子は発現ベクターには存在するものの、宿主への導入の際には目的部分のみが挿入されるため、生産菌JPBL011株には挿入されない。この遺伝子が生産菌JPBL011株に存在しないことは、シーケンス解析により確認されている。

エ 伝達性に関する事項

pJPV043、pJPV044、pJPV045及びpJPV035には伝達性を付与する配列は含まれていない。

140 オ 宿主依存性に関する事項

pJPV043、pJPV044、pJPV045及びpJPV035の複製にはBacillus属が必要である。

カ 発現ベクターの作成方法に関する事項

プラスミド pE194 に コピーの改変 *amyS* 遺伝子又は *prsA* 遺伝子に加え、その 他の配列を組み込むことにより発現ベクターpJPV043、pJPV044、pJPV045 及び pJPV035 を作成した。

キ 発現ベクターの宿主への挿入方法及び位置に関する事項

(5) 挿入遺伝子及びその遺伝子産物に関する事項

ア 供与体の名称、由来及び分類に関する事項 以下に詳細を示す。

挿入断片	供与体の由来	性質・機能
改変 amyS遺伝子	Geobacillus stearothermophilus ATCC7953 株	本申請添加物の有効成分で ある改変 amyS をコードす る。
prsA 遺伝子	Bacillus licheniformis Ca63 株	細胞膜たん白質である PrsA たん白質をコードする。菌体 外分泌たん白質の分泌量を 高める働きがある(参考資料 6)。
P3 プロモーター <i>(amyL4199/amyQsc/cryIIIA</i> プロモーター を連結したもの <i>)</i>	B. licheniformis Ca63株 Bacillus amyloliquefaciens DSM 7株 Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis DSM 5525株	改変 <i>amyS</i> 遺伝子及び <i>prsA</i> 遺伝子のプロモーターとして機能する。
amyL ターミネーター	B. licheniformis Ca63 株	改変 amyS 遺伝子の転写を 終結させる。
aprHターミネーター	Bacillus clausii DSM 8716 株	prsA 遺伝子の転写を終結させる。
rrnB ターミネーター	Escherichia coli K-12 株	に挿入された ターミネーター配列である が、 に特定の 酵素をコードする遺伝子の 挿入は行われなかったため、 ターミネーターとしては機 能していない。
改变cryIIIA mRNA 安定化配列	B. thuringiensis subsp. tenebrionis DSM 5525 株 Bacillus subtilis ATCC 6051a 株	目的たん白質の発現を促進 する。RBS 配列 25 bp が挿 入されることで改変された 翻訳調整配列。
cryIIIA mRNA 安定化配列	B. thuringiensis subsp. tenebrionis DSM 5525 株	目的たん白質の発現を促進する。

挿入断片	供与体の由来	性質・機能
amyLRBS配列	B. licheniformis Ca63株	目的たん白質の発現に必要で
		ある翻訳調整配列。
pdaC遺伝子の3'側領域	B. licheniformis Ca63株	各遺伝子座において、P3プロ
		モーターの5'側の隣接領域に
		中間株作製の段階で挿入さ
		れ、そのまま保持されたもの
		である。宿主の pdaC 遺伝子に
		由来し、またORFを含まない
		ため遺伝子機能を持たない。

160

イ 遺伝子の挿入方法に関する事項

(ア) ベクターへの挿入遺伝子の組込方法に関する事項

2. (4) カに記載のとおり、プラスミド pE194 に コピーの改変 amyS 遺伝子又は prsA 遺伝子に加え、その他の配列を組み込むことにより発現ベクター pJPV043、pJPV044、pJPV045 及び pJPV035 を作成した。

(イ) 挿入遺伝子の宿主への導入方法に関する事項

2. (4) キに記載のとおり、発現力セットを用いて、プロトプラスト化したB. *licheniformis*の形質転換をおこなった。

170

165

ウ 構造に関する事項

(ア) プロモーターに関する事項

改変amyS及びprsA遺伝子のプロモーターは、amyL4199プロモーター、amyQscプロモーター及びcryIIIAプロモーターで構成されるP3プロモーターを用いた。

175

(イ) ターミネーターに関する事項

改変amyS遺伝子のターミネーターは、Ca63株由来のamyLターミネーターを用いた。また、prsA遺伝子のターミネーターは $B.\ clausii\ DSM\ 8716$ 株由来のaprH遺伝子のターミネーターを用いた。

180

(ウ) 既知の有害塩基配列を含まないことに関する事項

ORF検索を行ったところ、多くのたん白質との相同性が確認されたが、これらのたん白質は有害作用を持たないと判断された。

185 エ 性質に関する事項

(ア) 挿入DNAの機能に関する事項

JPBL011株に導入された挿入DNAの機能及び挿入DNAから産生されるたん白

質の性質、機能は明らかとなっている。

- 190 (イ) DNAの分子量を示す事項 挿入遺伝子の塩基数は明らかとなっている。
 - (ウ)制限酵素による切断地図に関する事項 JPBL011株に導入された遺伝子の制限酵素による切断地図は明らかとなってい る。

オ 純度に関する事項

遺伝子導入用ベクターの配列は解析の結果、想定した通りである。またベクターは 陰イオン交換樹脂のカラムで精製されたものが用いられている。このことから目的外 遺伝子の混入はないと考えられる。

カ 抗生物質耐性マーカー遺伝子の安全性に関する事項

pJPV043、pJPV044、pJPV045及びpJPV035には、エリスロマイシン耐性を有する erm C遺伝子が含まれているが、宿主への導入の際には目的部分のみが挿入されるため、生産菌JPBL011株には挿入されない。この遺伝子が生産菌JPBL011株に存在しないことは、シーケンス解析により確認されている。

キ オープンリーディングフレームの有無並びにその転写及び発現の可能性に関する 事項

JPBL011株の挿入遺伝子の近傍配列について、ORF検索プログラムGetorfを用いてORF検索を行った。確認されたORFにおいて、NCBIをデータベースとした検索を行ったところ、有害作用を持つことが知られるたん白質はヒットしなかったことから、これらのORFから想定された、たん白質は有害作用を持たないと判断された。

- 215 (6) 組換え体に関する事項
 - ア 組換えDNA操作により新たに獲得された性質に関する事項 JPBL011株は、JPBL011 α -アミラーゼ生成能を獲得している。
 - イ 宿主との差異に関する事項

JPBL011株には、改変amyS遺伝子を含むカセットを導入することにより α -アミラーゼの生成能が付与されるとともに、改変amySの菌体外分泌効率の促進、

の違いが

あるが、これらの形質は病原性又は有害性生理活性物質に関するものではない。

ウ 外界における生存性及び増殖性に関する事項

225

195

200

205

210

生産菌であるJPBL011株とB. licheniformis野生株の外界における生存性及び増殖性に相違はない。

230 エ 生存及び増殖能力の制限に関する事項

生産菌であるJPBL011株とB. licheniformis野生株の生存及び増殖能力に相違はない。

- オ 不活化法に関する事項
- 235 JPBL011株は培養後に生産物から分離除去された後、90℃の加熱及び生石灰 CaOを用いたアルカリ処理(pH11以上)によって不活化される。この方法は非遺 伝子組換えの酵素生産菌の場合と同様である。
 - 3 組換え体以外の製造原料及び製造器材に関する事項
- 240 (1) 飼料又は飼料添加物の製造原料としての使用実績及び安全性に関する事項 JPBL011α-アミラーゼの製造に用いられる製造原料は、いずれも食品及び飼料に 使用される品質のものである。
- (2) 飼料又は飼料添加物の製造器材としての使用実績及び安全性に関する事項 JPBL011α-アミラーゼの製造に用いる発酵器材及びその他の設備(精製、製剤化) は、いずれも食品用酵素の製造に長年安全に使用された実績があり、その製造工程は ISO 9001 適合の認証を受けている。
 - 4 生産物に関する事項
- 250 (1)組換え体の混入を否定する事項

JPBL011α-アミラーゼ製造用原体中 (バッチ) に、JPBL011株由来の残存ゲノムが含まれていないことは、 遺伝子配列を指標としたPCR 解析により確認されている。

- 255 (2) 製造に由来する不純物の安全性に関する事項
 - JPBL011α-アミラーゼの製造用原体について、重金属を分析し、飼料添加物成分規格の基準値に適合していることを確認している。
 - (3) 精製方法及びその効果に関する事項
- 260 回転真空ろ過による細胞分離工程、及び限外ろ過等による精製工程により、非酵素成分が除去される。これらの工程を経た最終製品中に生産菌JPBL011株が存在しないことが確認されている。
- (4) 含有量の変動により有害性が示唆される常成分の変動に関する資料 265 JPBL011a-アミラーゼ製造用原体について、製造に用いられる原料及び製造方法

は従来の食品用酵素の製造 に使用されてきたものである。そのため、常成分の変動 範囲も従来の飼料添加物と同等であると考えられる。

(5)組換え体によって製造された生産物の外国における認可及び使用等の状況に関する事項

主な国の認可状況として、改変amySは米食品医薬品局(FDA)GRAS (Generally Recognized as Safe) の自己認証済である。

またルミスターはEFSA (欧州食品安全機関) において評価され、 2015 年に乳 牛用飼料添加物として認められた。

その他、北米及び欧州の各国で、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として使用されている。

5 2から4までにより安全性に関する知見が得られていない場合は次の試験のうち必要な試験の成績に関する事項 該当しない。

IV 審議結果

270

275

280

285

290

295

300

305

JPBL011 株を利用して生産された α-アミラーゼについて、「組換え DNA 技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続」に基づき審議した結果、飼料添加物として摂取する家畜等への安全上の問題はないと判断された。

V 参考文献及び参考資料

参考文献

- 1. Chapter 4: Safety evaluation of foods and food ingredients derived from microorganisms. Regulatory Toxicology and Pharmacology, Article 1990;12(3 PART 2):S114-S128.
- 2. 国立感染症研究所病原体等安全管理規程 別冊 1 「病原体等のBSL分類等」 https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/kanrikitei3/Kanrikitei3 202 0101-1.pdf. [accessed July 1 2021].
- 3. 国立感染症研究所病原体等安全管理規程 (改訂第三版) https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/kanrikitei3/Kanrikitei3 202 00401.pdf. [accessed May 31 2021].
- 4. Bacillus licheniformis TSCA Section 5(h)(4) Exemption: Final Decesion Document.

 https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/fra005.pdf [accessed May 16, 2018.

5. Horinouchi S, Weisblum B. Nucleotide sequence and functional map of pE194, a plasmid that specifies inducible resistance to macrolide, lincosamide, and streptogramin type B antibiotics. Journal of Bacteriology, Article 1982;150(2):804-814.

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

- 6. Kontinen VP, Sarvas M. The PrsA lipoprotein is essential for protein secretion in Bacillus subtilis and sets a limit for high level secretion. Molecular Microbiology, Article 1993;8(4):727-737.
- 7. Burgess SA, Flint SH, Lindsay D, Cox MP, Biggs PJ. Insights into the Geobacillus stearothermophilus species based on phylogenomic principles.(Report). BMC Microbiology 2017;17(1).
- 8. Nazina TN, Tourova TP, Poltaraus AB, Novikova EV, Grigoryan AA et al. Taxonomic study of aerobic thermophilic bacilli: descriptions of Geobacillus subterraneus gen. nov., sp. nov. and Geobacillus uzenensis sp. nov. from petroleum reservoirs and transfer of Bacillus stearothermophilus, Bacillus thermocatenulatus, Bacillus thermoleovorans, Bacillus kaustophilus, Bacillus. International journal of systematic and evolutionary microbiology 2001;51:433-446.
- 9. Sietske A, Diderichsen B. On the safety of Bacillus subtilis and B. amyloliquefaciens: a review. Applied Microbiology & Biotechnology 1991;36(1):1.
- 10. Federici BA. Insecticidal bacteria: an overwhelming success for invertebrate pathology. Journal of invertebrate pathology, Article 2005(1).
- 11. Ricci A, Allende A, Bolton D, Chemaly M, Davies R et al. Scientific Opinion on the update of the list of QPS-recommended biological agents intentionally added to food or feed as notified to EFSA. EFSA Journal 2017;15(3):1.
- 12. Riley M, Abe T, Arnaud MB, Berlyn MKB, Blattner FR et al. Escherichia coli K-12: a cooperatively developed annotation snapshot 2005. Nucleic Acids Research 2006;34(1):1-9.
- 13. 第 9 版 食 品 添 加 物 公 定書. . http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/kouteisho9e.html [accessed May 16, 2018.
- 14. Widner B, Thomas M, Sternberg D, Lammon D, Behr R et al. Development of marker-free strains of Bacillus subtilis capable of secreting high levels of industrial enzymes. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, Article 2000;25(4):204-212.

360	15.	COMMISS 14 Januar 2015 cond produced additive for	ry cerning tl by B	he auth acillus	orisatio licheni	on of a p	prepara (DS	ation of SM 21	alpha 564) as	amylase s a feed	e l
365		products I https://eur content/El [accessed]	<u>- lex.euro</u> N/TXT/?u	pa.eu/leri=urise	egal-					p. Z.o.o). .01.ENG	
370	16.	Ricci A, Al Opinion or agents int Journal 20	n the upd entionall	late of the	he list o	of QPS	recomi	mended	l biolog	gical	
375	17.	Riley M, A Escherichi 2005. Nuc	a coli K-	12: a coo	perativ	ely dev	eloped				ō
	18.	第 9 書 .	版	食	品	添	加	物	公	定	
380		http://www hin/ syoku	152	A TRANSPORT OF THE PROPERTY OF			The state of the s		140 L C	u/shoku	
385	19.	Widner B, Developme secreting b Microbiolo	ent of ma nigh level	rker-fre s of ind	ee strain ustrial	ns of Ba enzyme	cillus s es. Jou	ubtilis rnal of	capabl Indust	e of	
	20.	COMMISS 14 Januar	SION IM		SOTAR SOCIETA					015/47	of
390		2015 cond produced additive for products I https://eur	cerning the by Book Book Book Book Book Book Book Boo	acillus cows (ho esented	licheni older of by DS	formis the au M Nut	(DS thorisa critiona	SM 218 ation D al Prod <u>lex</u>	564) as SM Nu ucts S _j europa	s a feed itritional p. Z.o.o). i.eu/legal	l L
395		content/Ell [accessed]	Carried Trans.	さい スタル・ロスタグ とうごから	<u>erv%3A</u>	OJ.L	.201	<u>5.009.0</u>	1.0008	.01.ENG	
	参考	資料(申請	者提出 社	:外秘)							

列並びに構成(社外秘)(社内文書) 12

CERTIFICATE OF FREE SALE

(社内文書)

400

405

1.

2.

遺伝子導入ベクターpJPV043、pJPV044、pJPV045 及びpJPV035 の塩基配

(社外秘)

410	3.	Characterization registration batches and comparison (社外秘)(社内文書)	with tox b	oatch
	4.	JPBL011 株の遺伝子挿入部位の塩基配列(社外秘)(社内)	文書)	
	5.		社外秘)	(社
415		内文書)		
	6.		社外秘)	(社内
420		文書)		
	7.	18	社外秘)	(社
425	-	内文書)		ı
	8.	内文書)	社外秘)	(社
430	9.		1.60) (11)	
		書)	朴秘)(社 □	勺文
435	10.	Absence of recombinant DNA in the product (社外秘)	(社内文	書)
433	11.	Pepsin and Trypsin Cleavage Sites for Modified amyS 内文書)	(社外秘)	(社