

有明海の環境変化の要因に関する調査 （参考資料）

目次

1	貧酸素現象調査	
1.	調査概要	1
2.	これまでに得られた知見	2
3.	令和8年度の調査結果	4
2	赤潮調査	
1.	調査概要	7
2.	これまでに得られた知見	8
3.	令和8年度の調査結果	10
3	二枚貝類等生息環境調査	
1.	調査概要	12
2.	これまでに得られた知見	13
3.	令和8年度の調査結果	15

1 貧酸素現象調査

1. 調査概要

(1) 目的

- 貧酸素水塊の発生と淡水の流入状況や気象・海象等との関係を明らかにするため、水産庁・環境省（水産研究・教育機構に委託）及び九州農政局が共同で（水温、塩分、D0（溶存酸素）、濁度、クロロフィル等）の観測を実施。

(2) 令和8年度の調査実施状況




図1 有明海湾奥西側海域～諫早湾における調査位置
（観測線での調査位置）

水産研究・教育機構による水質の連続観測
事業名：豊かな漁場環境推進事業

海域	奥部西側域
担当機関	水産研究・教育機構
期間	7月～9月(30分毎)
調査定点数	2点(T13、P6)
調査方法	底層に設置した観測機器(T13) 自動観測ブイによる鉛直観測(P6)
調査項目	水温、塩分、D0

定点位置

海域	定点		北緯	東経	水深 (m)
奥部	St. 2	六角川観測塔	33° 08.15'	130° 13.25'	1
	T13	国営干拓沖	33° 06.75'	130° 12.79'	5
	P6	沖神瀬西	33° 03.75'	130° 13.30'	10
	SA		33° 02.17'	130° 14.08'	12
	P1	大浦沖	33° 00.00'	130° 14.50'	20
	SB		32° 57.67'	130° 15.50'	10
	SC		32° 55.33'	130° 15.00'	13
	B3	諫早湾央	32° 53.79'	130° 12.98'	8

九州農政局による水質の連続観測
事業名：国営干拓環境対策調査

海域	諫早湾
担当機関	九州農政局
期間	1月～12月(60分毎)
調査定点数	6点(S1、S6、B3、B4、B5、B6)
調査方法	自動昇降観測装置による鉛直連続観測
調査項目	水温、塩分、D0、濁度、クロロフィル、pH

定期観測

事業名：豊かな漁場環境推進事業

海域	奥部西側域～諫早湾
担当機関	水産研究・教育機構、福岡県、佐賀県
期間	7月～9月(1週間毎)
調査定点数	8点(T2、T13、P6、SA、P1、SB、SC、B3) 採水は5点(B3、P1、P6、T13、T2)
調査方法	多項目水質計による鉛直観測 採水(表層、2m、5m、海底上1m)
調査項目	水温、塩分、クロロフィル、濁度、D0、透明度 採水(栄養塩、植物プランクトン)

「赤潮ネット（沿岸海域水質・赤潮観測情報）」

<https://akashiwo.fra.go.jp>

《PC情報対応版》



(水産庁・環境省)

《携帯情報対応版》《PC情報対応版》



(九州農政局)

(3) ホームページによる提供

観測速報値については、水産研究・教育機構が管理・運営する「赤潮ネット（沿岸海域水質・赤潮観測情報）」に集約のうえ、随時、情報提供を実施。

2. これまでに得られた知見

○ 小潮期の潮流速低下・塩分躍層の形成（降雨後の河川流量増大に伴う表層塩分低下）・水温躍層の形成（晴天の連続による表層水温の上昇）による成層強化※により、底層への酸素供給量低下・底層での酸素消費量増加に伴い底層の溶存酸素量は減少し、貧酸素水塊を形成（図2～4）。

※成層～上層と下層の海水密度差が大きくなり、海水が上下で混ざりにくくなる状況

○ 貧酸素水塊の発生頻度は、有明海湾奥部西側と諫早湾中央から北部沿岸域で高く、これらの海域では貧酸素水塊が別々に形成（図5）。

○ 河川から供給された有機懸濁物質や、増殖した植物プランクトンの死骸等が、水中や海底面で好氣的分解を受けることにより、溶存酸素が消費され、溶存酸素量が低下するものと推定。

○ 有明海湾奥部西側海域や諫早湾中央から北部沿岸域では、海中の有機懸濁物や底泥中の有機物が多い粘土やシルト堆積物が多く、底泥の酸素消費量が多いために貧酸素水塊が発生しているものと推定。




図2 貧酸素水塊形成のメカニズム




図3 貧酸素水塊形成時の潮位・気象・水温・塩分の変化（平成26年7月）







図4 水温躍層と塩分躍層の形成状況（平成26年7月1日、7月14日、7月21日）





図5 貧酸素水塊の形成状況（平成26年7月14日→7月21日）




図6 海底上0.2mの溶存酸素量平面分布（平成26年7月21日）

令和8年度調査結果

○ 各地点における連続観測記録によれば、海域の貧酸素化は、諫早湾と有明海湾奥西部において概ね同時期（6月26日頃）に始まっており、有明海湾奥西側海域では7月3日前後や7月16日前後の大潮期に海水が鉛直混合することによって一時的に回復したが、その後、水温躍層の形成により8月10日頃まで継続した。また、諫早湾では塩分躍層が弱まった時期に水温躍層が形成され、貧酸素状態が8月10日頃まで継続した。その後、有明海湾奥部西側海域及び諫早湾ともに、8月15日前後の大潮期に貧酸素化が解消された。

【諫早湾】




図7 諫早湾における潮位、気象、表層と底層の塩分差・水温差、溶存酸素量の時系列変化（令和8年度）

注）観測データは機器観測による速報値

- 塩分躍層～表層（海面下0.5m）と底層（海底上0.5m）における塩分差が10程度を目安とした。
 - 水温躍層～表層（海面下0.5m）と底層（海底上0.5m）における水温差が3℃程度を目安とした。
 - 貧酸素水塊の目安～溶存酸素濃度3mg/L以下 一般的に、3mg/L以下になると生物が生息困難となるため、貧酸素水塊と呼ばれる。
- 〔参考文献：日本海洋学会（2005），有明海の生態系再生をめざして，211pp.，恒星社厚生閣，東京〕

令和8年度調査結果

【有明海湾奥部西側海域】




図8 有明海湾奥部西側海域における潮位、気象、塩分、水温、溶存酸素量の時系列変化（令和8年度）

注）観測データは機器観測による速報値

○貧酸素水塊の目安～溶存酸素濃度3mg/L以下 一般的に、3mg/L以下になると生物が生息困難となるため、貧酸素水塊と呼ばれる。

【参考文献：日本海洋学会（2005）、有明海の生態系再生をめざして、211pp.、恒星社厚生閣、東京】

出典元 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産技術研究所
「水産庁委託事業「豊かな漁場環境推進事業のうち海域特性に応じた赤潮・貧酸素水塊、栄養塩類対策推進事業」及び環境省請負業務「有明海・八代海湾再生評価支援（有明海二枚貝類の減少要因解明等調査）」において、国立研究開発法人水産研究・教育機構が取得した観測データ」





図9 貧酸素水塊の形成状況 (令和8年)
出典：水産技術研究所 環境・基盤部門 沿岸生産システム部

2 赤潮調査


1. 調査概要

(1) 目的

赤潮の発生海域や拡大状況を明らかにするため、

- ①水産庁、水産研究・教育機構及び有明海沿岸4県とが連携し、定期的な各種水質やプランクトン調査を実施し、
- ②クロロフィルa衛星画像データによる赤潮の拡大状況の解析等を行っている。

(2) 令和8年度の調査実施状況



調査位置

水産研究・教育機構による水質の連続・定期観測(豊かな漁場環境推進事業)

海域	奥部	
担当機関	水産研究・教育機構	
期間	令和8年7月～令和9年2月(30分毎)	7月～9月(1週毎) 10月～2月(隔週毎)
調査定点	3点(T13,P6)	8点(T2,T13,P6,SA,SB,SC,B3)
調査方法	表層に設置した観測機器(T13) 自動観測ブイによる鉛直観測(P6)	多項目水質計による鉛直観測
調査項目	水温、塩分、クロロフィル、濁度、溶存酸素(T13を除く)	水温、塩分、クロロフィル、濁度、溶存酸素、透明度

各県による水質の定期観測(豊かな漁場環境推進事業)

海域	奥部	中央部
担当機関	福岡県・佐賀県	熊本県
期間	10月～2月(隔週毎)	10月～2月(隔週毎)
調査定点	福岡県(T4,T5,6) 佐賀県(T2,T3,T13,P6,P1)	1-5, 7-9
調査方法	多項目水質計による鉛直観測 採水(表層、海底上1m)	多項目水質計による鉛直観測 採水(表層、10mまたは海底上1m)
調査項目	水温、塩分、クロロフィル、濁度、溶存酸素、透明度 採水(栄養塩、クロロフィル、植物プランクトン) 沈殿量	水温、塩分、クロロフィル、濁度、溶存酸素、透明度 採水(栄養塩、植物プランクトン) 沈殿量(St.7-9のみ)

九州農政局による水質の定期観測(令和8年度諫早湾海域水質調査その他業務)

海域	諫早湾
担当機関	九州農政局
期間	令和8年7月～9月(隔週毎) 令和8年10月～令和9年3月(毎週)
調査定点	3点(X3(B4),X4(B3),X5(S1))
調査方法	多項目水質計による表層・底層観測 採水(表層、海底上1m)
調査項目	水温、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、透明度 採水(栄養塩、クロロフィル) 沈殿量

定点位置

海域	定点	名称	北緯	東経	水深(m)
奥部	T2	六角川観測塔	33°08.15'	130°13.25'	1
	T3	早津江川観測塔	33°06.78'	130°17.42'	1
	T4	筑後川沖観測塔	33°05.57'	130°20.73'	1
	T5	大牟田沖	33°01.76'	130°21.93'	5
	6		33°00.70'	130°18.16'	12
	T13	国営干拓沖	33°06.75'	130°12.79'	5
	P6	沖神瀬西	33°03.75'	130°13.30'	10
	SA		33°02.17'	130°14.08'	12
	P1	大浦沖	33°00.00'	130°14.50'	20
	SB		32°57.67'	130°15.50'	10
中央部	SC		32°55.33'	130°15.00'	13
	B3	諫早湾央	32°53.79'	130°12.98'	8
	1	宇土市赤瀬沖	32°40.80'	130°29.36'	34
	2	熊本港沖	32°45.00'	130°28.86'	38
	3	菊池川河口沖	32°49.97'	130°27.67'	27
	4	玉名郡長洲町沖	32°53.49'	130°23.95'	26
	5	荒尾市沖	32°57.30'	130°21.16'	35
	7	熊本港地先	32°45.20'	130°32.16'	12
	8	玉名市横島町地先	32°48.60'	130°30.86'	11
	9	菊池川河口地先	32°51.50'	130°30.67'	11

「赤潮ネット(沿岸海域水質・赤潮観測情報)」の
ホームページアドレス

<https://akashiwo.fra.go.jp>



(3) ホームページによる提供

①水産研究・教育機構

観測速報値については、漁業関係者の方々を含めて、広く一般の方にも伝えることとし、水産研究・教育機構が管理運営する「赤潮ネット(沿岸海域水質・赤潮観測情報)」に集約し、随時、情報提供を実施。

2. これまでに得られた知見

(1) 海況調査

- 諫早湾では、降雨に伴う栄養塩類の流入や、晴天の継続に伴う高水温により、高いクロロフィル a 濃度（赤潮）を確認。（図10）
- 高いクロロフィル a 濃度時の赤潮の発生分布をみると、諫早湾、有明海湾口部（長崎県沖）、有明海湾奥部（福岡県沖・佐賀県沖）、有明海中央東部（熊本県沖）など、それぞれの海域で増加しており、赤潮が特定の海域から有明海全域へと拡大する状況はみられていない。（図11）





図11 海況調査（諫早湾）におけるクロロフィル a の推移（平成27年度）



（参考）赤潮調査地点位置図





図12 赤潮の分布状況（平成27年8月下旬～9月上旬）

※水産庁九州漁業調整事務所「九州海域の赤潮」データを基に作成


2. これまでに得られた知見

- クロロフィルa衛星画像データから赤潮の拡大状況を見ると、クロロフィルaは諫早湾内と有明海湾奥部（福岡県沖・佐賀県沖）、有明海中央東部（熊本県沖）など、それぞれの海域で増加したが赤潮が特定の海域から有明海全域へと拡大する状況は見られていない。（図12）



令和元年7月31日 13:49



令和元年8月1日 12:53



令和元年8月2日 13:37



注) 衛星画像データによるクロロフィルa濃度は濁りの影響を受けるため、浅海域(基本水準面0m以浅)は除外

図13 衛星画像データ(クロロフィルa)で見た令和元年7月下旬～8月上旬の赤潮の発生状況

3. 令和8年度調査結果

●令和8年度はクロロフィル a の分布からみると赤潮発生海域から全域へ拡大する状況は見られていない。

以下に5月～8月21日までの赤潮の発生状況とその構成種を示す（なお、4月に赤潮発生は確認されなかった）。

○福岡沖：①珪藻類のスケルトネマ属、タラシオシラ属、キートセロス属および渦鞭毛藻類のアカシオ属による赤潮が発生

②珪藻類のスケルトネマ属、渦鞭毛藻類のヘテロカプサ属（有害種の *H. circularisquama* ではない）、③ラフィド藻類のシャトネラ属、

④ラフィド藻類のシャトネラ属、⑤珪藻類のスケルトネマ属による赤潮が発生


○佐賀沖：⑥スケルトネマ属、⑦シャトネラ属、⑧シャトネラ属、⑨シャトネラ属による赤潮が発生、⑩クリプト藻等の微細藻類による赤潮が発生

○長崎沖：下記「諫早湾及び有明海」を参照


○熊本沖：⑪ラフィド藻類のヘテロシグマ属、⑫珪藻類のスケルトネマ属、⑬シャトネラ属、⑭シャトネラ属による赤潮が発生

○諫早湾及び有明海：7月以降、警報レベルとなる10 cells/mLを超えるシャトネラ属が各所で確認された（図中：●）。


【5月・6月の発生(4月発生なし)】



【7月の発生】



【8月21日までの発生】



凡例
●：10 cells/mLを超えるシャトネラ属
(顕著な着色域を除く)

図14 令和8年度の赤潮分布状況（8月21日まで）

3. 令和8年度調査結果

【衛星データ（クロロフィルa）による赤潮拡大状況の解析】

- 令和8年4月～7月における衛星データによるクロロフィルa濃度の分布をみるとクロロフィルa濃度の増加は発生海域に留まり、有明海全域へと拡大する状況は確認されず、過年度同様の傾向であった。




図15 衛星データによるクロロフィルa濃度の分布状況（令和8年5～7月）

3 二枚貝類等生息環境調査

1. 調査概要

(1) 目的

水産有用二枚貝類への影響を把握するために、有明海沿岸4県、水産庁、九州農政局が連携して、有明海全域で水質浄化機能を有する水産有用二枚貝類等を捕食するナルトビエイの摂餌状況等の調査を実施。

令和8年度の調査実施状況

水産庁及び有明海沿岸4県によるナルトビエイ駆除事業

水産庁：事業名：有害生物漁業被害防止総合対策事業 福岡県、佐賀県、熊本県：事業名（県単事業）



九州農政局によるナルトビエイ、アカエイ等捕獲調査
事業名：有明海特産魚介類生息環境調査



2. これまでに得られた知見

(1) 有明海における採捕実績

- 平成20年度～23年度は約400トン（約4万個体）のナルトビエイ等を捕獲。
- 平成24年度は約200トン（約2万個体）に減少し、以降、ほぼ横ばい傾向で推移。
- 推定来遊量についても、捕獲重量の経年変化と同様に、平成24年度以降、変動はあるものの10数万個体でほぼ横ばい状態を維持




図16 広域分布調査における捕獲重量




図17 ナルトビエイ推定来遊量の経年変化（DOI RAP法）

注1) 広域分布調査の捕獲数、重量

- ・ H18：九州農政局調査＋県単事業の集計値
- ・ H19～R7：九州農政局調査＋県単事業＋水産庁事業の集計値
- ・ 漁業者による日報をとりまとめた結果であり、ナルトビエイ以外の混獲魚種を含んでいる可能性有
- ・ 流し刺網、固定刺網、囲い刺網など、県や漁協によって漁法の異なるものをすべて集計したものとなっている。

※平成30年度は体盤幅・生残率・混獲率・令和元年度、令和2年度は生残率、混獲率の調査を実施していないため、平成27～29年度の3カ年の平均値を使用してDOI RAP法で推定した参考値を示した。


DOI RAP法：捕獲されたナルトビエイのサイズデータを元に、年齢構成、寿命、生残率、産仔数などの生態情報を加味して、年齢別の来遊量を推定する方法。

2. これまでに得られた知見

(2) ナルトビエイの摂餌量の推定結果

- 水産有用二枚貝類の推定摂餌量※¹は、平成20～22年度の2,000～2,500トンから、平成24年度には200トン以下にまで減少した。平成27年度以降は1,000トン程度で横ばいの状況である。
- 平成20年度以降の水産有用二枚貝類の漁獲量は概ね13,000トン以下で、平成26年度までは減少傾向、その後横ばいで推移し、令和2、3年度に大きく減少し、一時的に令和4年度は2,000トンまで増加した。

※¹ ナルトビエイの推定来遊量に対して、捕獲したナルトビエイ胃内容物のアサリ、サルボウ、タイラギの比率を乗じて算出



※漁獲量データは『九州農林水産統計年報（九州農政局統計部）』より抜粋。R7年度の「未」は、令和8年9月現在、未集計。

※平成20年度は胃内容物調査を実施していないため、内訳不明の参考値を示した。

※平成30～令和2年度は来遊量が参考値であり、胃内容物調査を実施していないため、内訳不明の参考値を示した。

※本図の推定摂餌量は、漁獲量に対する割合を示すものではない。ナルトビエイによる摂餌は漁場外でも確認されており、すべてが直接的に漁業資源へ影響するとは限らないが、漁場内での摂餌も行われていることから、漁業への影響は否定できない。

図18 水産有用二枚貝類漁獲量とナルトビエイによる推定摂餌量の経年変化

- また近年では、クロダイ（チヌ）がエイ類以外のアサリ食害生物※²として浮上している。

※² 出典：有明海・八代海等総合調査評価委員会第13回水産資源方策検討作業小委員会（令和6年2月）「有用二枚貝に係る資料の採集・整理・分析状況～資源の現状及び減耗要因関係を中心に～」

3. 令和8年度調査結果（調査継続中）

(1) 有明海における採捕実績

- 令和8年度におけるナルトビエイの7月までの捕獲量は約146トン（約1万1千個体）であり、5年平均重量の4月から7月までの合計値（約129.9トン（約1万個体））と比べて捕獲重量・個体数ともに増加した。





図19 広域分布調査^注における捕獲状況（左：捕獲重量、右：個体数）

注）広域分布調査の捕獲数、重量

- ・ H18：農政局調査＋県単事業の集計値
- ・ H19～R7：農政局調査＋県単事業＋水産庁事業の集計値
- ・ 漁業者による日報をとりまとめた結果であり、ナルトビエイ以外の混獲魚種を含んでいる可能性有
- ・ 流し刺網、固定刺網、囲い刺網など、県や漁協によって漁法の異なるものをすべて集計したものとなっている。

3. 令和8年度調査結果(調査継続中)

(2) ナルトビエイの胃内容物

- 長崎大学山口教授の先行研究※¹により、ナルトビエイの食性については貝類を専食すること、中でも二枚貝を好むことが分かっている。
- 本調査でも貝類を専食し、アサリ、サルボウ※などの水産有用二枚貝類を一定量摂餌していることを確認。
- しかし、産仔後2年までの小型サイズ（体盤幅55cm未満）では、サルボウ※等の小型の個体や巻貝類、その他二枚貝類などを多く摂餌していることを確認。
- 小型サイズ、大型サイズでは、アサリ、サルボウ※、カキの3種の割合が多い。年度によってその割合が相違しており、資源量を反映しているものと推定。
- タイラギの確認は平成21、23、27年度の3か年のみで、ごくまれであった。
- 令和8年度の調査では、過年度同様、二枚貝類を専食していることを確認（6月速報値）。
- 小型サイズ、中型サイズ、大型雄の各成長段階において、胃内容物に占めるカキの割合が増加していた（6月速報値）。

※¹ 出典：Yamaguchi, Kawahara, Itoh (2005) Occurrence, growth and food of longheaded eagle ray, *Aetobatus flagellum*, in Ariake Sound, Kyushu, Japan. Environmental Biology of Fishes 74:229-238

表1 成長段階別の胃内容物重量に占める各餌生物の百分率(%) (6月速報値)

成長段階	調査年度	水産有用二枚貝類(%)				カキ(%)	その他の二枚貝(%)	巻貝(%)	その他(%)	ナルトビエイ	
		アサリ	サルボウ	タイラギ	小計					個体数(n)	平均体盤幅(cm)
小型サイズ	H21	5.6	16.7	0.0	22.3	0.0	18.9	53.6	5.1	30	48
	H22	7.3	7.1	0.0	14.4	0.0	33.0	41.8	10.8	41	43
	H23	8.2	34.6	0.0	42.8	0.0	16.3	34.8	6.1	49	46
	H24	1.7	0.0	0.0	1.7	0.0	17.6	61.0	19.6	59	44
	H25	4.5	70.9	0.0	75.4	0.8	11.3	5.0	7.6	40	48
	H26	43.0	3.4	0.0	46.4	0.0	42.7	8.6	2.4	35	42
	H27	21.0	12.9	0.0	33.9	0.0	32.4	26.2	7.5	29	45
	H28	0.0	62.4	0.0	62.4	0.0	0.0	25.0	12.6	8	48
	H29	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	42.8	30.9	23.5	35	44
	R3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	16.7	0.0	6	43
	R4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.3	10.3	15.4	13	43
	R5	0.0	28.6	0.0	28.6	0.0	14.3	14.3	42.9	7	42
	R6	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	80.0	0.0	0.0	10	43
	R7	9.0	43.9	0.0	52.9	7.7	31.7	7.7	0.0	13	43
	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0	2	46
	全期間	7.4	18.9	0.0	26.2	1.2	35.6	24.0	16.9	25	45
中型サイズ	H21	19.4	36.8	3.0	59.2	8.8	21.4	0.0	10.7	67	72
	H22	42.6	14.3	0.0	56.9	0.0	17.0	5.7	20.4	58	72
	H23	20.5	58.8	0.3	79.6	9.3	6.2	2.8	2.1	64	69
	H24	31.1	9.1	0.0	40.2	30.4	14.7	14.6	0.1	55	69
	H25	5.9	56.6	0.0	62.5	13.3	22.8	0.0	1.4	72	68
	H26	42.2	40.0	0.0	82.2	12.2	3.9	0.0	1.7	72	72
	H27	19.5	13.9	0.0	33.4	21.5	25.6	13.9	5.6	36	72
	H28	4.6	62.0	0.0	66.6	6.2	14.7	8.2	4.4	25	71
	H29	14.5	29.8	0.0	44.2	21.2	32.5	0.2	1.8	26	71
	R3	0.0	26.3	0.0	26.3	21.0	46.9	5.3	0.5	19	73
	R4	7.1	7.1	0.0	14.3	48.2	7.1	9.0	21.4	14	76
	R5	50.0	0.0	0.0	50.0	22.2	11.1	11.2	5.5	18	76
	R6	33.3	0.0	0.0	33.3	25.0	41.7	0.0	0.0	12	72
	R7	6.0	17.4	0.0	23.4	11.8	57.4	7.4	0.0	17	72
	R8	0.0	40.1	0.0	40.1	34.9	12.5	0.0	12.5	6	80
	全期間	19.8	27.5	0.2	47.5	19.1	22.4	5.2	5.9	37	72
大型雄	H21	22.9	43.0	0.0	65.9	1.2	32.9	0.0	0.0	9	88
	H22	44.4	28.1	0.0	72.5	0.0	9.1	9.1	9.3	11	87
	H23	3.7	67.8	0.0	71.5	8.8	5.6	0.0	14.0	27	87
	H24	1.4	11.4	0.0	12.8	77.2	10.0	0.0	0.0	10	82
	H25	0.0	66.7	0.0	66.7	11.1	22.2	0.0	0.0	9	83
	H26	7.7	75.9	0.0	83.6	9.4	6.3	0.2	0.5	32	86
	H27	14.3	14.8	0.0	29.0	27.6	42.4	0.0	0.9	14	87
	H28	0.0	42.5	0.0	42.5	23.2	32.6	1.4	0.3	12	86
	H29	0.0	25.1	0.0	25.1	37.3	36.7	0.0	0.9	8	85
	R3	0.0	35.7	0.0	35.7	42.9	7.1	14.3	0.0	14	86
	R4	11.1	21.9	0.0	33.0	55.5	11.1	0.0	0.3	9	87
	R5	44.4	0.2	0.0	44.6	33.3	22.0	0.0	0.0	9	86
	R6	24.4	12.5	0.0	36.9	25.0	25.0	12.5	0.6	8	83
	R7	9.4	18.3	0.0	27.7	18.2	27.6	14.2	12.3	11	85
	R8	0.0	15.6	0.0	15.6	84.4	0.0	0.0	0.0	3	93
	全期間	12.2	32.0	0.0	44.2	30.3	19.4	3.5	2.6	12	86
大型雌	H21	0.0	29.1	18.9	48.0	23.6	7.0	0.0	21.4	15	111
	H22	57.2	21.5	0.0	78.7	15.9	0.2	0.8	4.5	12	103
	H23	7.7	43.0	0.0	50.7	41.1	0.0	1.0	7.2	12	112
	H24	7.1	11.4	0.0	18.6	67.2	0.0	7.1	7.0	14	108
	H25	0.0	83.4	0.0	83.4	16.6	0.0	0.0	0.0	12	110
	H26	0.0	60.8	0.0	60.8	26.3	8.7	4.0	0.1	23	109
	H27	0.1	5.1	15.3	20.5	56.0	16.6	6.3	0.7	16	105
	H28	0.0	1.1	0.0	1.1	78.6	20.0	0.0	0.3	5	101
	H29	0.0	9.9	0.0	9.9	48.9	28.5	3.9	8.8	10	120
	R3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	9	117
	R4	0.0	8.3	0.0	8.3	66.7	0.0	0.0	25.0	12	103
	R5	14.5	0.0	0.0	14.5	56.9	14.0	0.0	14.7	14	117
	R6	0.0	0.3	0.0	0.3	66.3	33.3	0.0	0.1	18	113
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	70.8	29.1	0.0	0.1	7	115
	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	3	123
	全期間	5.8	18.3	2.3	26.3	53.4	12.7	1.5	6.0	12	111

※表中の濃い網掛けは50%以上、淡い網掛けは20%以上を示す

その他の二枚貝類にはアサリ、サルボウ、タイラギ、カキ以外の二枚貝類と消化が進んだ二枚貝、不明二枚貝を含む。
その他にはヤドカリなどの甲殻類や貝類以外の生物群と、同定困難な不明種を含む。

※サルボウ（サルボウガイを含むフネガイ科）

3. 令和8年度調査結果(調査継続中)

(3) アカエイ類の胃内容物調査結果

○ 二枚貝類を専食するナルトビエイ来遊量の減少傾向がみられる一方で、その他の二枚貝類被害生物として、熊本県や福岡県の漁業関係者からアカエイ類が二枚貝類を摂餌しているとの情報が多く寄せられた。

○ 本調査では、有明海に生息するアカエイ科魚類6種※2の胃内容物組成を調べて、二枚貝類への被害の実態を調べた。

※2 出典：山口敦子、古満啓介、田北徹（2009）2章 有明海の魚類相、干潟の海に生きる魚たち－有明海の豊かさと危機－（日本魚類学会自然保護委員会編、）、p.15～21、東海大学出版会

○ 令和3年度からの調査で、アカエイ181個体、ヤジリエイ26個体、アリアケアカエイ12個体、シロエイ12個体の胃内容物を調査した（令和8年6月段階）。

○ 令和8年度調査にてアカエイ類の胃内容物の割合から、多くの個体は二枚貝類、甲殻類、魚類を摂餌していた。アリアケアカエイは魚類を多く摂餌していた（6月速報値）。

○ アカエイ類はクロダイ、イシガニ等と同様に雑食性でアサリを含む二枚貝類も摂餌しているが、ナルトビエイが二枚貝類を専門に摂餌する※3のに比べ、アカエイ類は最大33.3%であり比較的低い傾向がみられた（6月速報値）。

※3 出典：山口敦子（2009）3章 有明海が育むサメ・エイ類、干潟の海に生きる魚たち－有明海の豊かさと危機－（日本魚類学会自然保護委員会編、）、p.33～64、東海大学出版会

表2 アカエイ類の胃内容物確認個体数内（6月速報値）

年度	イズヒメ エイ	アカエイ	ヤジリ エイ	アリアケ アカエイ	シロエイ	ズグエイ
R3	0	44	5	1	1	0
R4	0	14	14	7	5	0
R5	0	41	2	3	4	0
R6	0	47	1	0	2	0
R7	0	19	1	0	0	0
R8	0	16	3	1	0	0
合計	0	181	26	12	12	0

表3 アカエイ類の胃内容物重量に占める各餌生物の百分率(%)
(令和8年6月データで作成)

種名	二枚貝類	巻貝	頭足類 (イ)	甲殻類 (エビ、カニなど)	多毛類 (ゴカイ)	魚類 (ハゼなど)	その他 (ナマコ、不明種)
アカエイ(n=16)	32.1	0.0	0.0	25.6	38.2	3.4	0.6
ヤジリエイ(n=3)	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0
アリアケアカエイ(n=1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
シロエイ(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※表中の濃い網掛けは50%以上、淡い網掛けは20%以上を示す。



【アカエイ】



【アリアケアカエイ】



【ヤジリエイ】



【シロエイ】