


誤飲を防ぐため、**施錠**された
場所に保管する等**保管管理の徹底**




誤飲防止のため
移し替えは**厳禁**！

確認しよう！**農薬ラベル**による
使用基準の**徹底確認**



使用前に必ずラベルで
作物名・使用方法・防護装備の
確認をしましょう！

〇〇××剤		農林水産省登録番号第00000号		
通用作物・害虫と使用方法		有効成分：●●●●●●…40%		
作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用時期	総使用回数
〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇	2000倍	発生初期	3回
〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇	2000倍	発生初期	〇回
〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇	1500倍	発生初期	〇回



土壌くん蒸剤を使用した
後の**適切な管理の徹底**

看板の設置等
周囲に配慮

土壌くん蒸剤
立ち入り禁止



住宅地等で農薬を使用する
際の**周辺への配慮及び**
飛散防止対策の徹底

近隣住民への
事前告知



正しく扱うことが
一番お得です！

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/

農薬の適正使用 農林水産省


検索



令和8年度農薬危害防止運動

農林水産省・厚生労働省・環境省・都道府県共催

農薬ラベルに記載されている
安全使用上の注意または
被害防止方法を確認しましょう



作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	Aを含む 農薬の 総使用回数	被害防止 方法
稲	コブノメイガ	1000倍	60～ 150 L/10a	収穫 21 日まで	3回 以内	散布	3回 以内	使用者: 長ズボン・ 長袖の 作業衣
	ツマグロヨコ バイ ウンカ類 イナゴ類 イネドロ オイムシ	1000倍～ 2000倍						
	カメムシ類	2000倍						

OK?



農薬散布時は、
適切な防護装備を着用することが最重要です。
農薬の直接付着や吸い込みを防ぐため、
その装備、準備バツチリ？

- ✓ 保護メガネ
- ✓ 農薬用マスク
- ✓ 不浸透性防除衣
- ✓ 不浸透性手袋
- ✓ 長靴

使用後は直ちに着替え、衣服を洗濯し、手洗い・うがい・入浴を徹底してください。

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/

農薬の適正使用 農林水産省

検索



令和 8 年度農薬危害防止運動

農林水産省・厚生労働省・環境省・都道府県共催