


## フグの混入に注意!!

スーパーなどで販売された小魚(豆アジ等)の中に毒性のあるフグの幼稚魚が混入する事例が多くみられています。誤って食べることがないようにご注意ください!


### 【混入のあった毒性のあるフグの例】



### 【間違えやすいフグの仲間】



## 夏休み特別イベント「しとっと? 国のお仕事」を開催しました。



令和3年8月2日から31日まで九州農政局ホームページにて夏休みイベント「しとっと? 国のお仕事」夏休みお家で冒険!!(島をめぐる国のお仕事を知らう!)を開催しました。

直接、会えない状況での開催でしたので、反響が気になるころでしたが、1,293名の方に閲覧していただきました。以下は、アンケートと子ども相談の一部です。

・楽しくて参考になるHPをありがとう。  
・漢字が多くて小さい子には難しいかな。

もっと米粉のレシピが知りたいな。

見てくれてありがとう。



# ◆有毒植物等による食中毒に要注意◆

毎年、山菜狩りなどで誤って有毒な野草やキノコを採取し、食べたことにより、食中毒が発生しています。

◎ **高齢者の方が、有毒植物を山菜などと間違っ**て食べて、**死亡する事案も発生**しています。

※R2.8 栃木県において、種類不明の野生キノコを喫食した死亡事案がありました！

☆ **確実に食用と判断できない植物やキノコは、**

**絶対に**

**採らない！ 食べない！  
売らない！ 人にあげない！**



**判断に迷ったら処分してください。野草などを食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を受けてください!!**



触っても  
だめだ  
よ!!

### カエンダケ

夏から秋にかけてブナなどの広葉樹林の地上に群生。毒性が強く、触っただけでも炎症が起きることがある。食べて死亡した例もある。



椎茸と間違えない  
で!!

### カキシメジ

秋にブナ、コナラなどの雑木林の地上に発生。カサは直径3~8センチメートルで、シイタケと間違えやすい。食べるとおう吐、下痢、腹痛などの中毒症状が起きる



### ツキヨタケ

秋にブナの枯れ木などに群生。カサは主に半円形で10~20センチメートルほど。初めは黄褐色、後に紫褐色~暗褐色になる。猛毒で、ヒラタケやシイタケと間違えやすいので要注意。



分からない  
ときは採ら  
ないで!!

### スギヒラタケ

夏から秋にスギ、マツなどの倒木や古株に群生。カサは白色で扇のような形状。脚の脱力、意識障害などを伴う急性脳症を引き起こす。昔は食用とされてきました。



美味しそう  
でも食べな  
いで!!

### ニガクリタケ

ナラタケに似ているが、死亡例もあるほど猛毒。針葉樹や広葉樹の枯れ木、倒木などに群生し、通年発生する。



### クサウラベニタケ

ウラベニホテイシメジやハタケシメジに似ている。おう吐、下痢、腹痛等の消化器系の中毒が起きる。

農水省 野生きのこによる食中毒を防ぐため

検索



(お問い合わせ先)

農林水産省九州農政局消費・安全部消費生活課

〒862-8527熊本市西区春日2-10-1

TEL 096-211-9111 (代) 内線4215 FAX 096-211-9700

