

マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュバント加）不活化ワクチン

平成 20 年 10 月 28 日（告示第 1563 号） 一部改正

平成 28 年 4 月 18 日（告示第 1020 号） 一部改正

1 定義

マイコプラズマ・ガリセプチカムの培養菌液を不活化し、油性アジュバントを添加したワクチンである。

2 製法

2.1 製造用株

2.1.1 名称

マイコプラズマ・ガリセプチカム R-980 株又はこれと同等と認められた株

2.1.2 性状

鶏に対して病原性を示す。

2.1.3 継代及び保存

原株及び種菌は、適当と認められた培地で継代する。

継代は、原株では 3 代以内、種菌では 2 代以内でなければならない。ただし、特に承認されたものは、その継代数以内とする。

原株及び種菌は凍結して -40°C 以下又は凍結乾燥して 5°C 以下で保存する。

2.2 製造用材料

2.2.1 培地

製造に適当と認められた培地を用いる。

2.3 原液

2.3.1 培養

培養した種菌を製造用培地に接種し、培養したものを培養菌液とする。

培養菌液について、3.1 の試験を行う。

2.3.2 不活化

培養菌液にホルマリンを加えて不活化後、適当と認められた希釈用液で遠心洗浄し、適量の希釈用液に再浮遊させたもの又は培養菌液にホルマリンを加えて不活化後、適当と認められた方法で濃縮したものを不活化菌液とする。

不活化菌液について、3.2 の試験を行う。

2.3.3 アジュバントの添加

不活化菌液を適当と認められた希釈用液で濃度調整し、油性アジュバントを添加したものを原液とする。この場合、適当と認められた保存剤を添加してもよい。

ただし、アジュバントは最終バルクの調製時に添加してもよい。

原液について、3.3 の試験を行う。

2.4 最終バルク

原液を混合し、濃度調整し、最終バルクとする。この場合、適当と認められた保存剤を添加してもよい。

2.5 小分製品

最終バルクを小分容器に分注して、小分製品とする。

小分製品について、3.4 の試験を行う。

3 試験法

3.1 培養菌液の試験

3.1.1 夾雑菌否定試験

一般試験法の無菌試験法 1 を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.1.2 生菌数試験

適当と認められた方法で試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 の総菌数試験を実施するものについては、本試験を実施しなくてもよい。

3.2 不活化菌液の試験

3.2.1 不活化試験

適当と認められた方法で試験するとき、適合しなければならない。

3.2.2 総菌数試験

適当と認められた方法で試験するとき、適合しなければならない。

3.1.2 の生菌数試験を実施するものについては、本試験を実施しなくてもよい。また、原液の調製時に本試験を行ってもよい。

3.3 原液の試験

3.3.1 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.4 小分製品の試験

3.4.1 特性試験

一般試験法の特性試験法を準用して試験するとき、固有の色調を有する均質な懸濁液でなければならない。異物又は異臭を認めてはならない。小分容器ごとの性状は、均一でなければならない。

3.4.2 無菌試験

一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.4.3 チメロサル定量試験

チメロサル添加製剤については、適当と認められた方法で試験品を処理したものを試料とし、一般試験法のチメロサル定量法を準用して試験するとき、適合しなければならない。

3.4.4 ホルマリン定量試験

ホルマリン添加製剤については、適当と認められた方法で試験品を処理したものを試料とし、一般試験法のホルマリン定量法を準用して試験するとき、ホルマリンの含有量は、0.2vol %以下でなければならない。

3.4.5 安全試験

3.4.5.1 試験材料

3.4.5.1.1 注射材料

試験品を注射材料とする。

3.4.5.1.2 試験動物

生ワクチン製造用材料の規格 1.1 由来の 4～7 週齢の鶏を用いる。

3.4.5.2 試験方法

試験動物 10 羽を試験群、3 羽を対照群とする。

注射材料 1 羽分を試験群の頸部皮下又は脚部筋肉内に注射し、対照群とともに 4 週間観察する。

3.4.5.3 判定

観察期間中、試験群及び対照群に臨床的な異常を認めてはならない。

3.4.6 力価試験

3.4.6.1 試験材料

3.4.6.1.1 試験動物

3.4.5 の試験に用いた鶏を用いる。

3.4.6.1.2 赤血球凝集抗原

マイコプラズマ・ガリセプチカム赤血球凝集抗原（付記1）を用いる。

3.4.6.2 試験方法

3.4.5 の試験最終日に試験動物から得られた各個体の血清について、赤血球凝集抑制試験を行う。

血清をリン酸緩衝食塩液で2倍階段希釈し、各希釈血清 25 μ L に等量の4単位のマイコプラズマ・ガリセプチカム赤血球凝集抗原を加えて混合し、15 ~ 20 分間処理した後、0.25vol %の鶏赤血球浮遊液を 50 μ L ずつ加えて振盪混合し、4 $^{\circ}$ Cで一夜処理した後、赤血球凝集の有無を観察する。

3.4.6.3 判定

赤血球の凝集が抑制された血清の最高希釈倍数を赤血球凝集抑制抗体価（以下「HI 抗体価」という。）とする。

試験群の HI 抗体価の幾何平均値は、40 倍を超えなければならない。ただし、特に承認されたものは、その幾何平均値とする。この場合、対照群は全て HI 抗体価 4 倍未満でなければならない。

4 貯法及び有効期間

有効期間は、1年9か月間とする。ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とする。

付記1 マイコプラズマ・ガリセプチカム赤血球凝集抗原

製造用株を培養し、ホルマリンを加えて不活化した菌液を遠心洗浄後、再浮遊し、これにグリセリンを等量加え、- 20 $^{\circ}$ C以下に保存したもの