

表8 SPF 兎群の検査及び処置

令和2年6月30日（告示第1246号）一部改正

| 病 原 体                           | 供試抗原 <sup>1)</sup> | 検査時期及び検査頭数 |                     | 検査方法 <sup>2)</sup> | 処 置                        |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
|                                 |                    | 時 期        | 頭 数                 |                    |                            |
| センダイウイルス                        | MN                 | 1 か月 毎     | 退役動物から10匹を<br>無作為抽出 | CF                 | 抗体陽性群・同居群 <sup>3)</sup> 全殺 |
| 日本脳炎ウイルス                        |                    | ”          | ”                   | HI                 | ”                          |
| マイコプラズマ プルモニス                   |                    | ”          | ”                   | 菌分離                | 陽性群・同居群 全殺                 |
| 緑膿菌                             |                    | ”          | ”                   | 菌分離                | ”                          |
| サルモネラ                           |                    | ”          | ”                   | 菌分離                | ”                          |
| サルモネラ ティフィムリウム                  | K-28               | ”          | ”                   | AGG                | 抗体陽性群・同居群 全殺               |
| パスツレラ ニューモトロピカ                  |                    | ”          | ”                   | 菌分離                | 陽性群・同居群 全殺                 |
| パスツレラ ムルトシダ                     |                    | ”          | ”                   | 菌分離                | ”                          |
| ボルデテラ ブロンチセプトチカス                | 64L                | ”          | ”                   | AGG                | 抗体陽性群・同居群 全殺               |
| トレプトコッカス ニューモニエ                 |                    | ”          | ”                   | 菌分離                | 陽性群・同居群 全殺                 |
| ストレプトコッカス ズーエピデミカス              |                    | ”          | ”                   | 菌分離                | ”                          |
| バシラス ビリフォルミス                    | RT MSK             | ”          | ”                   | CF ELISA IFA       | 抗体陽性群・同居群 全殺               |
| アイメリア                           |                    | ”          | ”                   | 鏡検                 | 陽性群・同居群 全殺                 |
| 兎吸吮ヒゼンダニ                        |                    | ”          | ”                   | 鏡検                 | ”                          |
| 兎ポックスウイルス                       |                    | ”          | ”                   | ELISA IFA          | 抗体陽性群・同居群 全殺               |
| 狂犬病ウイルス <sup>4)</sup>           |                    |            |                     |                    |                            |
| 兎粘液腫ウイルス／兎線維腫ウイルス <sup>4)</sup> |                    |            |                     |                    |                            |
| 兎出血病ウイルス <sup>4)</sup>          |                    |            |                     |                    |                            |

注 兎の健康状態、異常な点等については全て記録する。死亡した兎については病理組織学的検査等を行う。

- 1) 供試抗原は、他の適切な株を使用してもよい。
- 2) 同等な検査方法があればその検査法を採用してもよい。検査方法は、その妥当性が検証され、保証された方法で実施すること。HI：赤血球凝集抑制反応 ELISA：免疫酵素抗体法 IFA：間接蛍光抗体法 AGG：凝集反応 CF：補体結合反応
- 3) 同居群とは、陽性群と完全に隔離されていない群をいう。
- 4) 国内で発生がない（又は重要度が低い）ものについては、抗原、試験法及び処置については発生国が実施している方法を重視する。