

貯法
室温保存

猫用腸内寄生虫駆除剤

動物用医薬品 | 要指示医薬品 | 指定医薬品

小型・子猫用

ミルベマックス[®]
フレーバー錠

猫用

ミルベマックス[®]
フレーバー錠

ミルベマインシオキシム・ブラジクアンテル合剤

【組成・性状】

1. 組成

1錠中にそれぞれ次の成分を含有

成分	品名 ミルベマックスフレーバー錠	猫用 ミルベマックスフレーバー錠
ミルベマインシオキシム	4mg	16mg
ブラジクアンテル	10mg	40mg

2. 製剤の性状

小型・子猫用：灰黄色～褐色の楕円形の割線入りの錠剤

猫用：赤色～赤褐色の楕円形の割線入りの錠剤

【効能又は効果】

猫：猫回虫、猫鉤虫及び瓜実条虫の駆除

【用法及び用量】

体重1kg当たりミルベマインシオキシムとして2mg、ブラジクアンテルとして5mgを基準量として1回、食餌と同時に又は食後に経口投与する。体重別には、次の投与量による。

体重 0.5kg以上1kg以下 小型・子猫用ミルベマックスフレーバー錠を1/2錠
 体重 1kgを超え2kg以下 小型・子猫用ミルベマックスフレーバー錠を1錠
 体重 2kgを超え4kg以下 猫用ミルベマックスフレーバー錠を1/2錠
 体重 4kgを超え8kg以下 猫用ミルベマックスフレーバー錠を1錠
 体重 8kgを超え12kg以下 猫用ミルベマックスフレーバー錠を1と1/2錠

【使用上の注意】**【一般的な注意】**

- (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2)本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (3)本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

【使用者に対する注意】

- (1)誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- (2)本剤の有効成分ブラジクアンテルは、有機溶剤等に溶解した場合等、溶液の状態においては皮膚から吸収されることが知られている。分割時に皮膚に付着した場合には、直ちに石けんで洗い流すこと。

【猫に対する注意】

1 制限事項

- (1)本剤は、6週齢未満の猫には投与しないこと。
- (2)本剤は体重0.5kg未満の猫には使用しないこと。
- (3)本剤は猫以外の動物に使用しないこと。
- (4)本剤は犬糸状虫陽性猫には使用しないこと。

2 副作用

- (1)副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2)ときに一過性の消化管微候（嘔吐及び下痢等）が薬物の投与後に認められることがある。
- (3)本剤の投与後、幼若猫で過量投与により嗜眠等の全身微候、ふらつき等の運動失調、筋肉振戦等の神経微候が認められた例があることから、若齢猫に投与する場合は、特に用量を厳守すること。

3 相互作用

- (1)セラメクチン以外のマクロライド系化合物、並びに他の猫回虫、猫鉤虫及び瓜実条虫駆除薬と本剤との併用については安全性が確認されていないことから併用しないこと。
- (2)セラメクチンは本剤の有効成分であるミルベマインシオキシムと同系統の有効成分であり、作用機序が類似することから、併用の必要がある場合には慎重に投与すること。

4 適用上の注意

重度に衰弱した猫、重度の腎・肝障害の猫に対する安全性は確立されていない。これらの動物に対しての投与は推奨されないが、やむを得ず使用する場合には獣医師の適切な判断に基づき慎重に投与すること。

【取扱い上の注意】

- (1)使用済みの容器は、地方公共団体条例等に準い処分すること。
- (2)本剤を分割投与する場合は、速やかに使用すること。

【保管上の注意】

- (1)小児の手の届かないところに保管すること。
- (2)本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。

【その他の注意】

- (1)海外の定期安全性報告において、非常に稀な頻度で、嗜眠等の全身微候、運動失調、筋肉振戦等の神経微候が認められたとの報告がある。
- (2)本剤による条虫類駆除の確認の際、体節がバラバラになり半透明の状態で排出されるので注意深く観察すること。

※ 製造販売業者

ノバルティス アニマルヘルス株式会社
東京都港区西麻布4丁目2番24号

ノバルティスカスタマーサービス TEL 0120-162-419
月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00(祝祭日除く)