

Elanco™ AF1300

Tylan® Soluble

TM

100g カバ

動物用医薬品 要指示 指定

マクロライド系抗生物質

タイラン®水溶散

(一般的名称:タイロシン酒石酸塩散)

【成分及び分量】

品名	タイラン水溶散
有効成分	タイロシン酒石酸塩

【効能又は効果】
有効菌種: マイコプラズマ、ウレアプラズマ
本剤感受性の次の菌種: ブドウ球菌、レンサ球菌
適応症: 牛: マイコプラズマ性肺炎
豚: 豚マイコプラズマ性肺炎
鶏: 呼吸器性マイコプラズマ病

【用法及び用量】
1日1頭当たりタイロシンとして下記の量を水、代用乳または全乳に溶かして7日間経口投与する。
牛(3ヵ月齢を超える牛を除く): 2g(カバ)
飲水1L当たりタイロシンとして下記の量を均一に溶かして経口投与する。
豚(1ヵ月齢を超える豚を除く): 250mg(カバ)
鶏(産卵鶏を除く): 500mg(カバ)、1~5日
注意-獣医師等の処方せん・指示により使用すること
注意-使用基準の定めるところにより使用すること
【貯法】 室温保存
製造販売元(輸入発売元)
日本イーライリリー株式会社
兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-5
Elanco、タイラン、: イーライリリー社、その子会社又は関連会社が保有又はライセンスを行う商標又は登録商標です。

2016年1月作成
YL089643JAA

Elanco™ AF1300

Tylan® Soluble

TM

100g カバ

動物用医薬品 要指示 指定

マクロライド系抗生物質

タイラン®水溶散

(一般的名称:タイロシン酒石酸塩散)

【本質の説明又は製造方法】
本剤の有効成分であるタイロシン酒石酸塩は、米国イーライリリー社によって発見されたマクロライド系の抗生物質で、マイコプラズマ及びグラム陽性菌などに抗菌力を示します。
【薬理学的情報等】
(薬物動態)
タイロシンは吸収性が高く、吸収されたタイロシンは消化管に移行し、再吸収される(腸管循環)。また、肺や炎症組織などpHの低い組織への移行性に優れている。
(抗菌作用)
タイロシンはブドウ球菌や連鎖球菌などのグラム陽性菌及びマイコプラズマ等に作用する。タイロシンは感受性菌に対し、そのタンパク合成を阻害することにより作用する。

承認指令書 番号

農林水産省指令 14生畜第8474号

1

【使用上の注意】
(基本的事項)

1. 守らなければならないこと
(一般的注意)

- 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であっても、それを反復する投与は避けること。
- 本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意: 本剤は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物[牛(生後3月を超えるものを除く。)、豚(生後1月を超えるものを除く。)、鶏(産卵鶏を除く。)]について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。
牛(生後3月を超えるものを除く。): 食用に供するためにと殺する前14日間
豚(生後1月を超えるものを除く。): 食用に供するためにと殺する前3日間
鶏(産卵鶏を除く。): 食用に供するためにと殺する前3日間

2

(使用者に対する注意)

- 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- 本成分には、起炎性があるとの文献報告があることから、作業時には、防護メガネ、マスク、手袋等の防護具を着用し、眼、鼻、口等に入らないよう、また、皮膚に付着しないよう注意すること。
- 取扱い後、顔や手を石鹸と水で洗うこと。
- 万一眼に入った場合には、直ちに水でよく洗うこと。万一刺激が持続するようであれば、医師に相談すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤は有効期間内に使用すること、また、有効期間内であっても、開封後は多湿を避けること。
- 食品と区別して保管すること。
- 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

3

2. 使用に際して気を付けること
(対象動物に関する注意)

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- 3ヵ月齢以下であっても第一胃の発達が見られる子牛に本剤を水に溶かして投与すると、その吸収が悪くなるので、代用乳または全乳に溶かして投与すること。

【製品情報お問い合わせ先】
日本イーライリリー株式会社 エランコアニマルヘルス事業部
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5 TEL:078-242-8791

獣医師、薬剤師等の医療関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。

4